






Principios activos según su DCI

	Procaina	Lidocaína	Calcitonina S	Calcitonina H	Piroxicam	Ketoprofeno	Tenoxicam	Acetil salicilato	Tiocolchicosido	Pícolato de Mg	Complejo vit B	Cobamamide	Bulfomedilo	Ifenprodilo	Piribedilo	Pentoxifilina	Propranolol	Raubasina	Piracetam	Etamsilato	DHE	Frac. ribosomales	Dexclorfeniramina	Diazepam	Clorpromazina	Hidroxyzina	Meprobamato	Amitriptilina	Clomipramina	Acetil-leucina	Floroglucinol	Neostigmina	
Procaina							1																										
Lidocaína																																	
Calcitonina S																																	
Calcitonina H																																	
Piroxicam																																	
Ketoprofeno																																	
Tenoxicam																																	
Acetil salicilato																																	
Tiocolchicosido																																	
Pícolato de Mg																																	
Complejo vit B																																	
Cobamamide																																	
Bulfomedilo																																	
Ifenprodilo																																	
Piribedilo																																	
Pentoxifilina																																	
Propranolol																																	
Raubasina																																	
Piracetam																																	
Etamsilato																																	
DHE																																	
Frac. ribosomales																																	
Dexclorfeniramina																																	
Diazepam																																	
Clorpromazina																																	
Hidroxyzina																																	
Meprobamato																																	
Amitriptilina																																	
Clomipramina																																	
Acetil-leucina																																	
Floroglucinol																																	
Neostigmina																																	

	Mezcla compatible		Interacciones medicamentosas		Moléculas destruidas por la mezcla
	Mezcla incompatible		Mezcla ilógica, desaconsejada	1	Diluir en su disolvente y después en 3 volúmenes de procaina
2	Se diluye en 4 volúmenes de pentoxifilina	3	Diluir el complejo vitaminado en 3 volúmenes del otro producto	4	Diluir al menos en 2 volúmenes del anestésico.

COMPATIBILIDAD FISICO-QUIMICA DE ALGUNOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN MESOTERAPIA (según HUTEAU, modificado)

Y. Huteau. La Pharmacopée en Mésothérapie. Ed. Société Française de Mésothérapie, 3^e ed. Paris 2000.